




© EDUARDO MARABUTO

Hemorrhois hippocrepis


Hemorrhois hippocrepis (Culebra de herradura). Presente en el norte del continente africano y la mitad sur de la Península Ibérica, así como en la franja costera mediterránea. Muy termófila, es más abundante al nivel del mar, aunque alcanza los 1750 m. Frecuenta médios abiertos, pedregosos, incluso construcciones humanas. Es común en cultivos agrícolas. Su rango de temperaturas varía entre -4.1°C y 36.3°C, y el de precipitación entre 214 mm y 1343 mm anuales.

SITUACIÓN ACTUAL



TSS: 0,5870

SITUACIÓN FUTURA




Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos bajos en la distribución potencial. Los modelos proyectan aumentos en la distribución potencial actual de la especie entre un 147% y un 157% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de un 100% en 2041-2070.

ESTADÍSTICAS					
SUPERFICIES ACTUALES (KM2)					
Presencia:	96300 (19%)	% Protegido actualmente:		(14%)	
Área potencial:	184900	% Protegido futuro:		(15%)	
CGCM2	APF		OPF		
	A2	B2	A2	B2	
2011-2040	207900 (12%)	192500 (4%)	(88%)	(83%)	
2041-2070	310600 (68%)	255900 (38%)	(97%)	(94%)	
2071-2100	378200 (105%)	283400 (53%)	(99%)	(96%)	
ECHAM4	APF		OPF		
	A2	B2	A2	B2	
2011-2040	380200 (106%)	388100 (110%)	(100%)	(100%)	
2041-2070	474900 (157%)	456700 (147%)	(100%)	(100%)	
2071-2100	491700 (166%)	492700 (166%)	(100%)	(100%)	

(Culebra de herradura)

ESTATUS ACTUAL

LC



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN
• No se requieren medidas de adaptación.